

Filimon Cârdei: *Contribuții la fauna Nemastomatidelor din Bucovina (j. Rădăuți)*.  
(24.VI.1945)

Cu ocazia excursiilor făcute în vara anului 1942 în regiunea județului Rădăuți, au fost colectate forme de Nemastomatidae. Familia aceasta e reprezentată printr'un singur gen *Nemastoma*. Subspeciile *N. quadripunctatum* Kochii Nowitzchi, *N. lugubre-unicolor*. Roew. și *N. quadripunctatum lineatum* Soerensen sunt noi pentru fauna Bucovinei și a Moldovei.

*Nemastoma chrysomelas* Hermann. Lungimea corpului: 2,5 mm. Dealungul întregului corp se găsesc dințișori dublu dințați, așezați dealungul tergitelor. Chelicerele sunt netede. Apophiza chelicerelor bărbătușului scurtă și cu'n moț de păr. Picioarele foarte lungi și subțiri. Pedipalpii foarte subțiri și presărați cu peri. Pseudo-articulații: Femurul 1=3-7; 2=9-16; 3=3-8; 4=4-9. Coloarea brună, negricioasă. Găsită în frunzar. Pădurea Frătăuții-Nou, cantonul Vuleva. August 1942.

*Nemastoma lugubre-bimaculatum* Fabr. Lungimea corpului: 2-2,5 mm. Picioarele scurte. Pedipalpii neînarmați. Pseudo-articulații: Fem. 1=fără; 2=1-1; 3=1; 4=2-3. Coloarea întunecată. Carapacele cu 2 pete argintii. Găsită în frunzar. Pădurea Vicovul de Sus, cantonul Giungi. August 1942.

*Nemastoma lugubre-unicolor*. Roew. Aceleași caractere generale ca și la forma anterioară numai că pe carapace nu există petele argintii. În frunzar. Pădurea Brodina, la poalele muntelui Corbu. August 1942.

*Nemastoma quadripunctatum Kochii*. Nowickii. Femurul 2 și 3 între bază și mijloc cu 3-9 pseudo-articulații. Area cu o pereche de ridicături mediane purtătoare de țepi. Scutul boltit. De ambele laturi ale carapacei găsim 3 petișoare mai mici într'un grup. Pe delături și înapoi, petișoare mărunte și împrăștiate. Palpii și primele membre ale chelicerelor sunt galbene deschis. Găsită în frunzar și sub mușchi. Pădurea comunală Bilca. August 1942.

*Nemastoma quadripunctatum lineatum*. Soerensen. Caracterele speciei *quadripunctatum* și se deosebește de subspecia precedentă prin aceea că petele anterioare de pe carapace formează un fel de arc înaintea tuberului ocular. Boltirea scutului e mai puțin accentuată. Ridicăturile mai puțin ascuțite. În frunzar. Pădurea Putna, Măgura. August 1942.

*Zusammenfassung*. Dieser Beitrag enthält die in der Umgebung von Radauți (Bucovina) erbeuteten Nemastomatiden. Die Unterarten *Nemastoma quadripunctatum* Kochii Nowitzchi, *N. quadr. lineatum* Soersen und *N. lugubre unicolor* Roew. sind neu für die Fauna der Bucovina und Moldau.