

Derouet

Un seul exemplaire récolté : le 22-VII-1956, vers midi ; forêt de Boscodon ; petite clairière près de la fontaine de l'Ours, alt. 1.500 m ; sur fleurs de *Spirea*.

BIBLIOGRAPHIE

- PIC (M.). — Matériaux pour servir à l'histoire des Longicornes (Lyon-Saint-Amand, 1891-1917).
PICARD (F.). — Faune de France, Cérambycides (Lechevalier, 1929).
PODANY (C.). — Principales espèces de Cérambycides et leurs aberrations (ouvrage en cours de publication dans le *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*).

**Présence de *Liobunum rotundum* (Latr.)
dans les grottes de Recloses (S.-et-M.)**

(OPILIONES)

par L. DEROUET et Ed. DRESCO

Au cours d'une visite dans la grotte du Curé, à Recloses, le 28-VIII-55, nous avons observé et capturé des Opilions de l'espèce *Liobunum rotundum* (Latr.). Cet Opilion, extrêmement commun en forêt et dans la région, se tenait sur les parois du petit puits d'accès, en zone de pénombre et aussi sur les parois et la voûte de la chambre de gauche en bas du puits. Les Opilions se promenaient sur les parois, l'un d'entre eux y était appliqué, ventre et pattes à plat touchant entièrement la roche (stéréotropisme).

Malgré de nombreuses captures (ROYER, DRESCO), c'est la première observation de ce genre faite dans les grottes de Recloses, et c'est la première fois que nous y constatons la présence d'Opilions ; deux notes ont cependant été consacrées aux Arachnides (Araignées : BERLAND 1928 et DRESCO 1943), mais les Opilions n'y sont pas cités.

Les individus de *L. rotundum* se groupent souvent en colonies (individus observés : une douzaine ; capturés : six), et il est possible qu'à une certaine période — d'ailleurs probablement assez

limitée — la recherche d'endroits frais leur convienne (le temps du 28-VIII-55 était particulièrement lourd et orageux) ; il y a aussi peut-être une autre raison, à savoir que la grotte du Curé étant maintenant en propriété privée, n'est plus visitée et constitue un biotope tranquille ; nous y avons constaté au cours de notre visite l'importance de la colonie de *Meta Menardi* Latr. (Araneae) répartie dans toute la grotte (même dans la zone obscure), et l'absence totale de toiles géométriques (voir à ce sujet : DRESKO, 1943).

Liobunum Blackwalli Meade, voisin du *L. rotundum*, fréquent dans la région, et souvent mélangé à cette dernière espèce, a été capturé le même jour à Recloses (Maison Forestière du Clos du Roi) ; il était absent de la grotte.

Une forme nouvelle de Carabe pour la faune française

par E. LEBIS

***Chrysotribax hispanus* Fabr. var. *infernalis*.**

Taille : 24 à 32 mm.

Tête de grosseur normale. Dent du menton longue et aiguë.

Pronotum un peu plus long que large ♂, aussi large que long ♀. Les angles postérieurs peu prolongés en arrière. Sillon médian net, mais peu profond, avec une large dépression peu profonde vers le tiers postérieur. Fossettes basales larges, mais relativement peu profondes.

Elytres larges, peu rétrécis sur leur premier tiers, beaucoup moins bombés que chez les autres races de l'espèce : chez certains exemplaires, ils sont presque sub-plans sur le disque. Côtés presque régulièrement arqués, même chez les ♂. Primaires nettement marqués par des lignes élevées coupées de fossettes bien nettes, et formant ainsi des chaînons allongés souvent très visibles. Le reste de la sculpture relativement peu accentué, sur un fond presque lisse.