

18

BULLETIN

MEDEDEELINGEN

DU

VAN HET

Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique

Koninklijk Natuurhistorisch
Museum van België

Tome XI, n° 20.

Deel XI, n° 20.

Bruxelles, juillet 1935.

Brussel, Juli 1935.

LISTE DES ARACHNIDES D'EXTRÊME-ORIENT
ET DES INDES ORIENTALES RECUEILLIS, EN 1932,
PAR S. A. R. LE PRINCE LÉOPOLD DE BELGIQUE,

par Louis GILTAY (Bruxelles).

SCORPIONES.

Buthidae.

1. — *Lychas mucronatus* (FAB.).

2 ♂, 10 ♀, Tjandi Koesoema (Bali), 25/26. IV. 1932.

3 ♀, 1 juv., Tjandi Koesoema (Bali), 27. IV. 1932.

Cette espèce a une très large aire de dispersion allant de la Birmanie et du Tenasserim jusqu'à la Chine, la Malaisie, l'Insulinde et Flores. Elle a été introduite à Madagascar et en Nouvelle-Zélande.

Scorpionidae.

2. — *Heterometrus cyaneus* (C. L. KOCH).

1 ♀, Tjandi Koesoema (Bali), 27. IV. 1932.

1 juv., Tjandi Koesoema (Bali), 25/26. IV. 1932.

1 ♀, Pasanggrahan, Ngamplang-Garoet (Régence des Préanger, Java), 15. V. 1932.

Les exemplaires de Bali viennent étendre vers l'Est l'aire de dispersion de l'espèce dont la limite orientale était Java.

L'exemplaire de Ngamplang a la vésicule caudale noire, concolore avec le reste des segments postabdominaux; la vésicule

vaguement annelés de foncé. Tibia I muni de 5 paires d'épines. Abdomen brunâtre clair, orné de très fins points noirs.

Epigyne: fig. 8.

AFFINITÉS :

Par les caractères de l'épigyne notre espèce est à ranger près de *Ctenus hosei* Poc. décrit de Sarawak et de la rivière Baram (Bornéo) (5), elle s'en distingue néanmoins par la coloration et ses caractères propres.

Sparassidae.

20. — *Panaretus* sp.

1 juv., Monacan (Palawan), 5. IV. 1932.

Trop peu développé pour être déterminé spécifiquement.

OPILIONES.

Phalangodidae.

21. — *Epedanus lutescens* THOR.

1 ♂, S. Bilis (Bornéo), V. 1932.

Signalé de Sambas (Sarawak) (THORELL) et de Matang (Bornéo) (ROEWER).

Phalangiidae.

22. — *Gagrella atrorubra* SIMON.

1 ex., Forêt de Kongkoi, 6/7. II. 1932.

Espèce signalée de Perak-Gunong Inas (SIMON, ROEWER).

23. — *Gagrella flava* ROEWER.

4 ex., environs de Prae (Siam Nord), trouvés le long d'une petite rivière. « Des milliers d'arachnides semblables, les uns

(5) POCOCK (R. I.), *Spimen (Aranea), Erg. Zool. Forschungsreise in den Molukken und Borneo von Dr Willy Kükenthal* (Abh. Senckenb. Nat. Ges. Bd. 23, pp. 591-629, Pl. XV, 1897), p. 608, Pl. XV, figs. 14-14b.

CAMBRIDGE (F. O. PICKARD), *On the Cteniform Spiders of Ceylon, Burmah, and the Indian Archipelago, West and North of Wallace's Line, etc.* (Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 6, vol. XX, pp. 329-356, Pl. IV, oct. 1897), p. 345, Pl. IV, figs. 11, 17, 20, 28-30.

sur les autres, grouillaient à un endroit au bord de l'eau. »
20. II. 1932.

1 ex., Pha Thai (N. Siam), 24. II. 1932.

Espèce signalée de Cochinchine, mais sans localité précise
(ROEWER).

24. — *Gagrellula bimaculata* ROEWER.

1 ex., Forêt de Kongkoi, 6/7. II. 1932.

Signalée de Kedah (Malacca) et de Sumatra (ROEWER).
